



Μοτίβα συνταγογράφησης Αντικαταθλιπτικών Φαρμάκων στην Νόσο Πάρκινσον (ΝΠ): Τάσεις στην Ελλάδα

Βασίλης Καραγεωργίου^{1*}, Ιωάννης Μιχόπουλος¹, Μιχαήλ Χατζούλης², Παναγιώτα Μήτρου³, Ελευθέριος Θηραΐος⁴, Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης⁵, Πέτρος Σκαπινάκης⁶, Ρωσσέτος Γουρνέλλης¹

1 Β Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, ΠΓΝ Αττικών. 2 Τμήμα Ψυχιατρικής, Άγιοι Ανάργυροι, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ. 3 Υπουργείο Υγείας, Αθήνα, Ελλάδα. 4 National Agency for Quality Assurance in Health S.A., Athens, Greece. 5 ΗΔΙΚΑ, Αθήνα, Ελλάδα. 6 Τμήμα Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή

Η κατάθλιψη είναι συχνή στη ΝΠ

Οι ασθενείς είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε πτώσεις, ορθόσταση.

‘Ειδικός’ φαινότυπος με προεξάρχουσα την απάθεια παρά μελαγχολία

Προφίλ ανεπιθυμητων ενεργειων ποικιλει

-Μιρταζαπίνη καταστέλλει



Μεθοδολογία

Συστηματική καταγραφή συνταγογραφήσεων



Υπολογισμός συννόησης

Σχετικές συχνότητες αντικαταθλιπτικών σε ΝΠ+κατάθλιψη

Odds Ratios (95% CI)

Πολυφαρμακία: ταυτόχρονη χορήγηση 2 ή παραπάνω φαρμάκων

Αποτελέσματα

25,581 ασθενείς με ΝΠ+καταθλιπτικές διαταραχές

4.73 (4.64, 4.81) φορές μεγαλύτερη πιθανότητα Κατάθλιψης σε ΝΠ (48.1% των ΝΠ vs 7%)

Συγκρίσιμη η πολυφαρμακία (27% ΝΠ >=2 φαρμακα vs 25%)

	Συχνά στη ΝΠ	Λιγότερο Συχνά στη ΝΠ
Αντικαταθλιπτικά	Μιρταζαπίνη 1.700 (1.640 - 1.770)	Φλουοξετίνη 0.540 (0.510 - 0.580)
	Σερτραλίνη 1.170 (1.120 - 1.210)	Παροξετίνη 0.572 (0.492 - 0.652)
	Ντουλοξετίνη (1.36 (1.21, 1.51))	
Βενζοδιαζεπίνες	Κλοναζεπάμη (1.10 (1.02 - 1.18))	Αλπραζολάμη, διαζεπάμη
Άτυπα αντιψυχωσικά	Κουετιαπίνη 1.740 (1.670 - 1.810)	Ολανζαπίνη ομοιόμορφη (0.94 (0.81, 1.07))

Αποτελέσματα

Αυξημένη χρήση **μιρταζαπίνης** και **κουετιαπίνης**, αυπνία ο στόχος;

-Ντελικάτη Ισορροπία με καταστολή

Παρά την καλή τεκμηρίωση και ειδική για τον υποπληθυσμό ΝΠ+ΜΚΕ, SSRIς προτιμώνται **λιγότερο**

Φαίνεται σεβασμός στον D2 υποδοχέα, **κουετιαπίνη**

Τι θεραπεύουμε;

Χρειάζεται επαναξιολόγηση των κλινικών επιλογών